

Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä.

Liikennevalo: Vihreä asetetuilla ehdoilla

Vaikuttavuus: Satunnaistetut tutkimukset osoittavat, että 30 vrk:n hoito on tehokkaampi kuin 10 vrk:n hoito.

Turvallisuus: Pienimolekyylisillä hepariineilla verrannollinen lyhytkestoiseen. Fondaparinuuksilla vuotoriski mahdollisesti suurempi.

Kustannukset: Kustannusvaikuttavuustieto Suomesta puuttuu. Uudet lääkkeet ovat selvästi hepariinia kalliimpia.

Kliininen suositus: Pitkä (kuukauden mittainen) laskimotukoksen ehkäisy lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä. Valmiste valitaan potilaskohtaisesti riskin perusteella.

Rajoitukset: Yleiset antitromboottisen hoidon rajoitukset.

Työnjako: -

HALO-katsaus: Halinen M, Lassila R, Miettinen H, Kärkkäinen M, Kaila M. Laskimotukoksen ehkäisy lonkan ja polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä. Suom Lääkäril 2008;63:1165-9.



HALO-katsauksissa arvioidaan uusia terveydenhuollon menetelmiä.

HALO-neuvottelukunta antaa katsausten perusteella liikennevaloin koodattuja suosituksia käyttöönotosta.

Suosituksat julkaistaan Lääkärilehdessä.

Liikennevalo määritetään vaikuttavuuden, turvallisuuden ja kustannusten mukaan.

Vihreä = käytä,
keltainen = käytä tietoa keräten,
punainen = älä käytä.

Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä.

Liikennevalo: Keltainen / käytä tietoa keräten

Vaikuttavuus: Lyhyt (vähintään 10 vrk) profylaksi on satunnaistettujen tutkimusten mukaan vaikuttava. Pitkäkestoisen profylaksin hyödystä verrattuna lyhytkestoiseen ei ole riittävää tietoa.

Turvallisuus: Pienimolekyylisillä hepariineilla verrannollinen lyhytkestoiseen. Fondaparinuuksilla vuotoriski mahdollisesti suurempi.

Kustannukset: Kustannusvaikuttavuustieto Suomesta puuttuu. Fondaparinuuksi on selvästi hepariinia kalliimpi.

Kliininen suositus: Kaikille vähintään lyhytkestoinen hoito. Suuren tromboosivaaran potilaille yksilöllisesti pitkä (30 vrk) profylaksi.

Rajoitukset: Yleiset antitromboottisen hoidon rajoitukset.

Työnjako: Suositellaan erikoisalojen tiivistä yhteistyötä.

HALO-katsaus: Halinen M, Lassila R, Miettinen H, Kärkkäinen M, Kaila M. Laskimotukoksen ehkäisy lonkan ja polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä. Suom Lääkäril 2008;63:1165-9.



HALO-katsauksissa arvioidaan uusia terveydenhuollon menetelmiä.

HALO-neuvottelukunta antaa katsausten perusteella liikennevaloin koodattuja suosituksia käyttöönotosta.

Suosituksat julkaistaan Lääkärilehdessä.

Liikennevalo määritetään vaikuttavuuden, turvallisuuden ja kustannusten mukaan.

Vihreä = käytä,
keltainen = käytä tietoa keräten,
punainen = älä käytä.